



« **NÉMAZOTE**,
le mélange moutarde-trèfle
résistant aux nématodes! »

La semence qui vous parle !



DELEPLANQUE

La performance, c'est notre ADN

NÉMAZOTE

L'INDISPENSABLE MÉLANGE MOUTARDE BLANCHE ANTI-NÉMATODES ET TRÈFLE D'ALEXANDRIE !

> AVANTAGES AGRONOMIQUES

- **ASSOCIATION CRUCIFÈRE - LÉGUMINEUSE**
favorisant le piégeage N-P-K et la fixation de l'azote
- **AMÉLIORATION DE LA STRUCTURE DU SOL**
- **APPORT IMPORTANT DE MATIÈRES ORGANIQUES**
- **LIMITATION DU LESSIVAGE** des éléments minéraux

> ACTION ANTI-NÉMATODES

- **EFFET ANTI-NÉMATODES** de la moutarde *LUCIDA*
note 2, compris entre 70 et 90%
- **PIÉGEAGE DU NÉMATODE DE LA BETTERAVE**

> RÉPONSE RÉGLEMENTAIRE

- **MÉLANGE CONFORME**
À LA RÉGLEMENTATION CIPAN / SIE

> PRODUCTIVITÉ

- **PLUS DE 4 TONNES DE MS / HA**



> NÉMAZOTE OPTEZ POUR L'ASSOCIATION CRUCIFÈRE - LÉGUMINEUSE

> Descriptif du mélange


Synergie parfaite: L'excellente synergie entre crucifères et légumineuses ainsi que la complémentarité de leur système racinaire contribuent à l'amélioration de la structure de votre sol. L'expérimentation menée par l'ITB met en évidence un rendement en matière sèche très élevé, supérieur à 4 t/ha (voir graphique 1).

Reliquats élevés: L'association moutarde blanche - trèfle d'Alexandrie produit davantage d'éléments minéraux N-P-K disponibles pour la culture suivante (voir graphique 2). C'est entre 60 et 80 u supplémentaires d'azote fixé.


Action anti-nématodes: La moutarde blanche **LUCIDA** est anti-nématodes. Elle assure le piégeage des nématodes de la betterave (*Heterodera schachtii*). **NÉMAZOTE** réduit la population de nématodes de 70 à 90%.

> Performances

CAPACITÉ DE PRODUCTION DE MATIÈRE SÈCHE



QUANTITÉ D'AZOTE, DE PHOSPHORE ET DE POTASSE FIXÉE



Extraits essai ITB 2009

> NÉMAZOTE CONSEILS CULTURAUX

> Composition

Moutarde blanche anti-nématodes **LUCIDA** 70%.

Trèfle d'Alexandrie 30% (*Trifolium alexandrinum L.*).

Le trèfle d'Alexandrie nécessite une préparation du sol bien affinée et plombée.

> Implantation

Post semis : Après une orge d'hiver (escourgeon), il est conseillé de détruire les repousses par un déchaumage avant de semer **NÉMAZOTE**.

Dose de semis : 12 à 15 kg / ha.

Date de semis : Aussitôt la moisson effectuée.

Conditionnement : Sac de 25 kg.

> Destruction

La floraison tardive de **LUCIDA** permet au couvert de rester en place au moins 10 semaines avant d'envisager sa destruction selon les conditions climatiques.

> Application

La moutarde **LUCIDA** étant anti-nématodes, **NÉMAZOTE** est préconisé pour les assolements betteraviers.

> CONTACT



DELEPLANQUE
La performance, c'est notre ADN

Deleplanque & Cie - CS70100 | 35 bis rue des Canus 78603 Maisons-Laffitte
Tél. +33 (0)1 34 93 27 27 | Fax 01 39 62 51 49 | couverturesol@deleplanque.fr | www.deleplanque.fr