



« **NÉMAZOTE**,
le mélange moutarde-trèfle
résistant aux nématodes! »

La semence qui vous parle !



 **DELEPLANQUE**

NÉMAZOTE

L'INDISPENSABLE MÉLANGE MOUTARDE BLANCHE ANTI-NÉMATODES ET TRÈFLE D'ALEXANDRIE !

> AVANTAGES AGRONOMIQUES

- **ASSOCIATION CRUCIFÈRE - LÉGUMINEUSE** favorisant le piégeage N-P-K et la fixation de l'azote
- **AMÉLIORATION DE LA STRUCTURE DU SOL**
- **APPORT IMPORTANT DE MATIÈRES ORGANIQUES**
- **LIMITATION DU LESSIVAGE** des éléments minéraux

> ACTION ANTI-NÉMATODES

- **EFFET ANTI-NÉMATODES** compris entre 70 et 90% (moutarde note 2)
- **PIÉGEAGE DU NÉMATODE DE LA BETTERAVE**

> RÉPONSE RÉGLEMENTAIRE

- **MÉLANGE CONFORME**
À LA RÉGLEMENTATION CIPAN / SIE

> PRODUCTIVITÉ

- **PLUS DE 4 TONNES DE MS / HA**



> NÉMAZOTE OPTEZ POUR L'ASSOCIATION CRUCIFÈRE - LÉGUMINEUSE

> Descriptif du mélange


Synergie parfaite: L'excellente synergie entre crucifères et légumineuses ainsi que la complémentarité de leur système racinaire contribuent à l'amélioration de la structure de votre sol. L'expérimentation menée par l'ITB met en évidence un rendement en matière sèche très élevé, supérieur à 4 t/ha (voir graphique 1).

Reliquats élevés: L'association moutarde blanche - trèfle d'Alexandrie produit davantage d'éléments minéraux N-P-K disponibles pour la culture suivante (voir graphique 2). C'est entre 60 et 80 u supplémentaires d'azote fixé.


Action anti-nématodes: Grâce à la présence de moutarde anti-nématodes dans le mélange, **NÉMAZOTE** assure le piégeage des nématodes de la betterave (*Heterodera schachtii*) et il réduit la population de nématodes de 70 à 90%.

> Performances

CAPACITÉ DE PRODUCTION DE MATIÈRE SÈCHE



QUANTITÉ D'AZOTE, DE PHOSPHORE ET DE POTASSE FIXÉE



Extraits essai ITB 2009

> NÉMAZOTE CONSEILS CULTURAUX

> Composition

Moutarde blanche anti-nématodes 60%.

Trèfle d'Alexandrie 40% (*Trifolium alexandrinum* L).

Le trèfle d'Alexandrie nécessite une préparation du sol bien affinée et plombée.

> Implantation

Application : Le mélange anti-nématodes **NÉMAZOTE** est préconisé pour les assolements betteraviers.

Date de semis : Aussitôt la moisson effectuée. Après une orge d'hiver, il est conseillé de détruire les repousses par un déchaumage avant de semer **NÉMAZOTE**.

Dose de semis : 12 à 15 kg / ha.

Conditionnement : Sac de 25 kg.

> Destruction

La floraison tardive de la moutarde permet au couvert de rester en place au moins 10 semaines avant d'envisager sa destruction selon les conditions climatiques.

> CONTACT



Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à demander le **LIVRE DES COUVERTURES DE SOL**.

- **Paule ARTERO** - 07 77 68 58 59 - paule.artero@deleplanque.fr
- **Patrick de BUSSY** - 06 13 54 75 72 - patrick.de.bussy@deleplanque.fr
- **Thomas FOISSEY** - 06 08 34 05 63 - thomas.foissey@deleplanque.fr
- **Benjamin GEFFROY** - 06 28 64 39 67 - benjamin.geffroy@deleplanque.fr
- **Raphaël MUSNIER** - 06 01 35 17 35 - raphael.musnier@deleplanque.fr

